

1. Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i informacjami na etykiecie.
2. Przed użyciem należy sprawdzić właściwy rozmiar oraz stan produktu. Nie używać ortezy uszkodzonej, pękniętej lub nadmiernie zużytej.
3. Stabilizator należy prawidłowo dopasować. Nie może powodować nadmiernego ucisku, bólu, drętwienia, mrowienia ani zaburzeń krążenia.
4. W przypadku wystąpienia bólu, podrażnienia skóry, drętwienia, mrowienia lub innych niepokojących objawów należy natychmiast przerwać użytkowanie.
5. W przypadku świeżego urazu, silnego bólu, obrzęku, zabiegu operacyjnego lub rehabilitacji przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.
6. Nie należy samodzielnie modyfikować, przecinać, zszywać ani usuwać elementów konstrukcyjnych produktu.
7. Produkt należy czyścić i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta. Chronić przed wysoką temperaturą i uszkodzeniem.
8. Wyrób medyczny nie zastępuje konsultacji lekarskiej, diagnozy ani leczenia.
9. Produkt należy stosować wyłącznie u osób, dla których dany model i rozmiar są przeznaczone.
10. W razie wątpliwości dotyczących prawidłowego stosowania produktu należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.